RECOMMANDATIONS EVIPREV 2026

Bénéfice: important – élevée; modéré – moyenne; faible – dépendant de la situation individuelle

Importance/force de la recommandation

Les recommandations EviPrev sont soutenues par : SGAIM SSMIG SSGIM, KHM CMPR CMB, mfe, FMH, unisanté



Les policliniques universitaires et instituts de médecine de famille suivants ont participé à l'élaboration de ces recommandations:
Lausanne, Genève, Berne, Zürich et Bâle

Initiales:

ABI: Ankle-brachial Index
BPCO: bronchopneumopathie chronique obstructive
CT: computed tomography
ECG: électrocardiogramme
F: femme
FIT: Fecal Immunochemical Test
FR: facteurs de risque
FRAX: outil d'évaluation des risques de fractures
FRCV: facteurs de risque cardio-vasculaire
GSLA: Groupe de travail lipides et artériosclérose
H: homme
hsCRP: high-sentitivity CRP
IMC: indice de masse corporelle [kg/m²]
OFSP: office fédéral de la santé publique
PSA: antigène spécifique de la prostate
UPA: unité paquet année
US: ultrasons
VIH: virus de l'immunodéficience humaine

* Dépistage plus précoce en cas de facteurs de risque

[1] Les populations à risque sont définies dans l'Annexe au tableau EviPrev

Interventions pour lesquelles les données sont insuffisantes pour les recommander aux personnes asymptomatiques

- Dépistages cancers : peau, bouche, vessie.
- Dépistages CV : fibrillation auriculaire dès 50 ans, artériopathie périphérique par index pression systolique (ABI), maladie cardiovasculaire par ABI/hsCRP/score calcique coronaire, maladie coronarienne par ECG/test d'effort lors de risque CV intermédiaire ou élevé, anévrisme aortique chez F fumeuses ou ex-fumeuses de 65 à 75 ans.
- Autres dépistages : dysfonction thyroïdienne, apnée du sommeil, maladie coeliaque, carence en vitamine D, troubles du comportement alimentaire, glaucome dès 40 ans, troubles visuels dès 65 ans, troubles auditifs dès 50 ans , troubles cognitifs dès 65 ans

Interventions non recommandées chez les personnes asymptomatiques

- maladie coronarienne (ECG de repos et d'effort, score calcique/CT-angio coronarien) si faible FRCV
- sténose carotidienne (US)
- BPCO (Spirométrie)
- bactériurie (chez M et F non-enceintes)
- cancers de la thyroïde, du pancréas, de l'ovaire et du testicule

Vaccinations

Version actualisée le 19.02.2026

Recommandations vaccinales OFSP
populations à risque

Les recommandations vaccinales présentées dans ce tableau sont basées sur le Plan de vaccination suisse publié par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en accord avec les recommandations de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). Eviprev.ch n'est pas responsable du contenu ni de la formulation de ces recommandations.
Ce tableau propose uniquement une présentation simplifiée et mise en forme de l'information officielle, dans le but de faciliter le travail des médecins de premier recours lors des consultations de prévention vaccinale au cabinet.
Pour consulter les recommandations officielles et les mises à jour en vigueur, veuillez vous référer au site de l'OFSP : https://www.bag.admin.ch/fr/plan-de-vaccination-suisse



[2] Les populations à risque sont définies dans le Plan de vaccination suisse de l'OFSP. Pour les recommandations actuelles, se référer à la version en ligne: https://www.bag.admin.ch/fr/plan-de-vaccination-suisse
[3] Vaccination non remboursée par l'assurance obligatoire des soins. Pour cette raison, l'OFSP recommande la vaccination VRS, mais séparément du plan de vaccination suisse 2026. Voir les recommandations: https://www.bag.admin.ch/dam/fr/sd-web/ROjGfpexE5Pp/fr_BAG_Bulletin_36-25_RSV_bf.pdf